Veüe Le 22e juillet 1758

Observation Communiquée à L'Academie Royale de Chirurgie par le sieur Bauchot Maître en chirurgie aggregé à Vannes, Chirurgien Major de L'hopital Militaire, et de la Marine du Port Louis, Correspondant de la ditte Academie. ——————

L'Extirpation des anciennes hémorhoïdes, Lorsqu'elles sont soupçonnées d'être devenües squirreuses et Carcinomateuses, Paroit suspecte: C'est même rarement qu'on obtient du Malade la liberté de mettre ce moyen en usage, cependant, comme il n'y en a pas de plus efficace, les divers accidens qui peuvent resulter de leur présence le déterminent, et sollicitent le Chirurgien à ne point differer cette opération. Elle est quelquefois salutaire, et L'observation suivante fournit une exemple de son heureux succès.

En 1756 le 10 9bre je fus mandé par Mr. de Loubressay, commandant le bataillon de fontenay, Milice, âgé d'environ 50 ans, bien Constitué mais de temperament flegmatique et Bilieux. Il Etoit depuis 7 à 8 ans tres frequemment incommodé par la présence d'hémorhoïdes internes, alors squirreuses et disposées à carcinome. Elles devenoient en partie Externes chaque fois qu'il alloit à la Garderobe: un flux hémorhoïdal auquel il Etoit aussy sujet périodiquement, devenu plus excessif, s'etoit supprimé depuis six jours, à la suite d'une fievre d'abord Irréguliere puis tierce, occasionnée par une abondance de bile, avec épanchement, couleur jaune &ca. —

L'Evacuation en fut excitée par des Clisteres Emoliens, des Aposemes tirés du sucs des Plantes temperantes apéritives avec la Mane, la Casse, et les Tamarins, les Julepes delayants antiflogistiques furent aussy mis en usage. Cette bille prit aisement cours par bas. La fievre, et La Couleur jaune, qui n'en Etoient que les Effets, se dissiperent; mais les dernieres Evacuations sans doute plus acres occasionnerent un tenesme, et la sortie de 5 à 6 boutons d'hémorhoïdes, figure et grosseur de Marons, joignés à cela le Renversement de la membrane Interne du Rectum, qui formoit un bourlet aux deux tiers de leur circonference. L'evenement surprit d'autant moins le Malade, qu'il l'avoit presque toujours Eprouvé jusqu'alors, et qu'une legere Compression suffisoit pour reduire la tumeur cependant le peu de reussite, qu'eut sa Manoeuvre ordinaire continuée pendant trois jours, l'allarmèrent, et ~~[illegible]~~ ——

Je trouvay le faisceau d'hémorhoïdes gorgé à L'exterieur avec étranglement. La fievre avoit été violente dans le Commencement de l'inflammation,

ARC 56 n°43
Académie Nationale de Médecine Bibliothèque

et suivie de la suppression presque totale des selles et des urines. L'on fit
les remedes generaux, saignées, applications emolientes, vapeurs, bains...
rien ne pût diminuer l'etranglement. au contraire il fut suivi du deffaut
d'oscillation, de la remission soudaine de la douleur, et si l'affaissement du
ventre de même que le retour involontaire des urines n'annonçoient pas
un pronostique flatteur, la couleur brune et l'odeur fetide qu'exhaloit la
partie affectée faisoient encor plus craindre pour la vie du Malade, puis
qu'elles ne laissoient aucun doute de la mortiffication presente.

J'employay les toniques ou balsamiques spiritueux. je fis des scarifi=
=cations qui devinrent insuffisantes, même inutiles. les parties se sphacel=
=lerent, et obligerent le 9.e jour de la premiere epoque d'en venir sans aucun
retardement à l'extirpation. les mauvaises suites qui furent annoncées par
le medecin ordinaire du Malade vraysemblablement à l'extremité, n'y porterent
aucun obstacle. je convins du peu de ressource qui restoit dans ce cas à la
medecine; mais j'eus la hardiesse d'assurer qu'il y en avoit encore beaucoup
pour la Chirurgie

Ma premiere intention étant de ranimer le malade, et soutenir le principe
de vie qui paroissoit vouloir s'eteindre, je luy fis prendre quelques cuillerées d'une
potion alexipharmaque (l'alkali volatil.) il fut contenu ensuite sur le bord du
lit dans une position favorable. puis je cernay avec un bistouri demi courbe,
et j'emportay hardiment et sans peine tout le faisceau composé des 6 boutons
d'hemorroïdes sphacellées, ainsy que leur pédicule, qui fermoit exactement
l'entrée du rectum, où s'etoit fait l'etranglement. il me fallu de même enlever
un tiers du bourlet formé de la membrane interne et du sphincter qui étoit
aussy mortiffié. le sang qui sortit ~~d'abord~~ dans l'operation, etoit noir, d'odeur insup=
=portable et presque coagulé. son evacuation degorgea la partie, et fit place
à l'entrée du doigt indice de la main gauche dans l'anus. il fut bientot suivi
de celuy du milieu, avec les ~~quels~~ je saisis l'une après l'autre deux
tumeurs, la 1.re squireuse, et la 2.e carcinomateuse. je les coupay avec le
bistouri herniaire à 2 travers de doigt dans le rectum, d'où elles étoient
adherentes par un pedicule assez fort. cette derniere operation, un peu difficile,
fut suivie d'une effusion considerable de sang arteriel, qui jointe à la foiblesse
du malade, me mit dans le cas de finir: car j'avois touché plus loin
quelques autres tumeurs, que je n'eusse pas plus épargnées, quoique
moins considerables que les premieres, mais il s'agissoit d'arrester l'hémora=
=gie; et pour y parvenir il falloit decouvrir par estime, le point où l'arteriolle
hemorroïdale interne fournissoit. pour comprimer directement sur l'endroit
où j'avois separé le pedicule du carcinome, j'insinuay et y portay l'extremité

Du doigt Indice je laissay un peu de jour entre luy et l'anus qui etoit deja fort dilaté, et le sang s'arrêta; mais quand je relevois l'extremité du doigt il en sortoit de nouveau. j'avois dans mon plat d'appareil plusieurs morceaux d'agaric de chêne preparé, et armé d'un fil. avec des Pinces à anneau j'en conduisis un qui prit la place de l'extremité du Doigt. je le couvris d'une compresse graduée, en reappliquant toujours le même Doigt, pour contenir, jusqu'à ce que j'y eusse substitué une tente, d'un volume capable de faire a peu près le même effet. je remplis la playe de bourdonnets recouverts de plumasseaux empreints d'un mélange de Miel et d'huile d'oeuf. quand au reste, je suivis l'appareil ordinaire des fistules à l'anus.

Le Malade se trouva moins mal dans la nuit. les forces revinrent à la faveur de legers cordiaux et de restaurans. je le saignay croyant prévenir l'inflammation &ca. mais la fievre et tension du ventre survenües Malgré cette premiere saignée, determinerent à une seconde, et aux boissons emollientes, juleps calmans, anodins, nécessaires pour adoucir l'ardeur des urines &ca. je joignis à ce traitement un regime très severe, et le tout en relâchant, a donné plus de calme et de souplesse aux parties.

Les premiers pansemens furent sensibles. cependant craignant la Corruption, je substituay d'abord l'huile d'hypericum à celle d'oeuf, et dès le troisieme jour que la supuration fut établie le morceau d'agaric se présenta sans aucun retour d'hemoragie. je commençay alors d'animer le dygestif, à mesure que les pansements devenoient moins douloureux. je mis le malade à l'usage d'une legere infusion de quinquina, avec l'Iris, edulcorée de miel de Narbonne, tant pour empecher la mortification que pour accelerer la chute des escarres.

Les tumeurs restantes ne parurent point incommoder le malade. aussy ne voulut-il point me les laisser toucher. il se crut, vû sa bonne situation, delivré de l'ennemi qu'il avoit affecté depuis sept ans. en effet des le 8e. jour il sortit quelques escarres, et parties hemorroïdales comme glanduleuses avec des fibres entrainées par le pus, qui, diminuant peu à peu de sa quantité, devint blanc, de bonne consistance, et d'odeur supportable.
La constipation mit dans le cas d'avoir recours aux Laxatifs, qui evacuerent des excremens noirs et fetides, que des lavemens detersifs, donnés comme par injection lors des pansemens firent changer en mieux. l'usage en fut continué, parce qu'ils servoient comme de lotion et detergeoient toutes les Playes. desorte qu'avec le secours des differens dygestifs, les sucs nourriciers y arriverent Librement, et developerent les petits Vaisseaux, les fibres s'alongerent et se forgeterent si —

Académie nationale de médecine Bibliothèque

avantageusement, pour remplir les vuides par des Chairs nouvelles reprimées selon le besoin, que les cicatrices solides et sans douleur, qui en resulterent le 28.e jour, ne parurent avoir ni diminué la capacité ni gêné les fibres du rectum. le sphincter continua ses fonctions, et laissa la libre issüe aux excremens.

Je conseillay au Malade de suivre longtemps un regime moderé, d'entretenir la liberté du ventre, non par la dangereuse poudre d'ailhot dont il avoit precedemment fait usage, mais par des humoratifs en lavem.ts de simple eau de riviere; je luy fis aussy sentir l'utilité de quelques saignées faites aux differentes saisons, pour alterer les humeurs, et dedommager la nature du deffaut où elle s'alloit peut être trouver d'un flux hemorhoïdal. j'adjoutay que si les tumeurs restantes, ou celles qui pourroient se former par la suite, le travailloient encor, le parti de l'extirpation seroit celuy qu'il faudroit prendre sans balancer.

No. 43.

Je ne me flatte point que cette observation paroisse rare, et ce n'est pas le seul espoir qui m'engage à la produire. ma principale ambition est de conserver l'estime de l'Academie, jusqu'à ce qu'un peu de relache me permette de travailler à meriter de nouveaux suffrages. je crois cependant qu'on a peu mis en oeuvre cette opération, lorsque le danger a paru si évident. si c'est trop attendre pour se determiner, c'est prouver au moins que l'incertitude du succés ne doit pas détourner de l'entreprise. et pourquoy ne mettroit-on pas en usage des moyens si salutaires? deux motifs également pressans se joignent pour y resoudre: on le doit à l'espoir flatteur de prouver à la gloire de la Chirurgie que les Malades trouvent souvent dans ses armes un secours qui leur manque d'ailleurs, et qu'elle seule peut leur procurer; on le doit au juste desir de seconder une celebre Academie, qui n'épargne ny ses lumieres ny ses generosités, pour porter à sa perfection

Le plus utile et le plus précieux de tous les arts.